



## Trattamento dell'otite esterna acuta eritematoso-ceruminosa

Soluzione auricolare spray a base di idrocortisone aceponato (0,584 mg/ml). Il prodotto è consigliato come trattamento di prima scelta dell'otite esterna acuta eritemato-ceruminosa.



### CONFEZIONI

Codice AIC / EAN	Prodotto	Confezione
105672012	Cortotic	Flacone da 16 ml

### INDICAZIONI

Per il trattamento dell'otite esterna acuta eritemato-ceruminosa. L'otite batterica e fungina è spesso di origine secondaria. La condizione dermatologica sottostante deve essere identificata e trattata.

In caso di otite parassitaria, deve essere attuato un appropriato trattamento acaricida. La presenza di corpi estranei, tumori e qualsiasi altra causa insolita di otite deve essere esclusa. Non usare in caso di perforazione della membrana timpanica.

### POSOLOGIA

Uso auricolare. La dose raccomandata è di 0,44 ml di medicinale veterinario per orecchio interessato una volta al giorno per 7 giorni consecutivi. Questa dose viene erogata adeguatamente da due attivazioni della pompa. Se la condizione non è considerata completamente guarita dal medico veterinario entro 7 giorni, il trattamento può essere prolungato fino a 14 giorni. La risposta clinica ottimale potrebbe non essere osservata fino a 28 giorni dopo la prima somministrazione. Si raccomanda di pulire il condotto uditivo esterno (ad es. utilizzando un detergente per le orecchie) e asciugarlo prima del primo trattamento.

### COMPONENTI

- Ogni ml contiene:
- Principio attivo: Idrocortisone aceponato 0,584 mg
  - Eccipienti: Etere di metile glicole propilenico

Scopri di più sul nostro sito: <https://vet-it.virbac.com/vet-it.virbac.com/home/prodotti/cane/otologici/cortotic>