



Antiparassitario spot on a base di fipronil

Spot on per trattamento delle infestazioni da pulci e zecche, con sistema ferma-goccia per un'applicazione più precisa e controllata.



CONFEZIONI

Codice AIC / EAN	Prodotto	Confezione
104069012	Effipro - gatto	4 pipette da 0,5 ml
104070014	Effipro duo - cane small (2-10 kg)	4 pipette da 0,67 ml
104070038	Effipro duo - cane medium (10-20 kg)	4 pipette da 1,34 ml
104070053	Effipro duo - cane large (20-40 kg)	4 pipette da 2,68 ml
104070077	Effipro duo - cane xl (40-60 kg)	4 pipette da 4,02 ml

INDICAZIONI

Per il trattamento delle infestazioni da **pulci** (*Ctenocephalides* spp.) e **zecche** (*Dermacentor reticulatus*).

L'efficacia insetticida contro nuove infezioni da pulci persiste fino a 8 settimane per il cane e fino a 5 settimane per il gatto.

Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida fino a 4 settimane contro le zecche per il cane e fino a 2 settimane per il gatto (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*).

Se sono presenti le zecche di alcune specie (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus*) quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le 48 ore dalla prima applicazione ma potrebbero essere uccise entro una settimana.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della **Dermatite Allergica da pulci (DAP)** quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Per il foglietto illustrativo completo, consultare:

https://www.vetinfo.it/j6_prontuario/farmaci/prontuariofiles/public/openPdf/5122/

POSOLOGIA

Tenere la pipetta in posizione verticale. Scuotere la parte più stretta della pipetta per assicurarsi che il contenuto sia entro la parte più larga della pipetta. Rompere il sigillo in cima alla pipetta spot-on lungo la linea segnata. Separare il pelo del gatto fino a che sia visibile la pelle. Porre la punta della pipetta direttamente contro la cute scoperta e schiacciare gentilmente alcune volte per svuotare il contenuto.

Per il gatto, ripetere l'operazione in uno o due differenti punti della schiena del gatto, preferibilmente alla base della testa e tra le scapole.

Per il cane, ripetere l'operazione in uno o due differenti punti della schiena del cane.

È importante assicurarsi che il prodotto sia applicato su di una area dove l'animale non possa leccarlo e assicurarsi che gli animali non si leccino tra di loro dopo il trattamento.

COMPONENTI

Fipronil